

lundi

mardi

mercredi

jeudi

vendredi

samedi

dimanche



1

La pilule est-elle un moyen de contraception fiable à 100% ?



3

Peut-on utiliser la plaquette de pilules d'une amie ?



7

Peut-on être enceinte en prenant la pilule et en utilisant le préservatif ?



2.1

En prenant la pilule, fait-on une prise de sang pour vérifier le taux de cholestérol, triglycérides, glycémie ?



4 - La pilule peut-elle rendre stérile si elle est fortement dosée et qu'on la prend depuis longtemps ?



8

Vous venez de rompre une relation avec votre partenaire. Est-il préférable d'arrêter la pilule ?



2.2

En prenant la pilule, fait-on une prise de sang pour vérifier que l'on a pas le sida ou une autre ist ?



5 Faut-il obligatoirement passer par un gynécologue pour prendre la pilule ?



9

Est-ce qu'une jeune fille qui fume peut prendre la pilule ?



2.3

Lorsque l'on prend la pilule, peut-on faire un don de sang ?



6

Est-il vrai que la pilule fait grossir ?



10

La pilule peut-elle être délivrée gratuitement ?



11

Pourquoi dit-on de prendre la pilule à heure fixe ?



15

Quel est le mode d'emploi de la pilule ?



19

À quel moment de la journée prendre la pilule ?



12

Est-il vrai que l'âge légal pour prendre la pilule est de 15 ans ?



16

Peut-on être enceinte en prenant la pilule ?



20

Les oublis répétés de pilule sont dangereux pour la santé. Vrai ou faux ?



13

La pilule peut-elle être délivrée sans ordonnance en pharmacie ?



17

Si on oublie de prendre la pilule pendant 3 jours, peut-on prendre 3 pilules d'un coup ?



21

Que faire en cas d'oubli de prise de pilule ?



14

Comment se procurer la pilule sans en parler aux parents lorsqu'on est mineure ?



18

Vous n'utilisez pas le préservatif mais vous prenez la pilule. Y a-t-il risque d'être enceinte ?



22

Peut-on être enceinte lors des 7 jours d'arrêt de pilule entre 2 plaquettes ?



23

Si on oublie de prendre une pilule au cours d'une plaquette, y a-t-il un risque de grossesse ?



27

Peut-on arrêter la pilule à tout moment ?



31

Le préservatif protège-t-il efficacement contre les Infections Sexuellement Transmissibles ?



24

Est-il imprudent de faire l'amour avec une fille qui a oublié de prendre la pilule ?



28 En arrêtant la pilule quelques mois, doit-on la reprendre au 1^{er} jour, au 14^e jour ou au dernier jour des règles ?



32

Le préservatif peut-il entraîner des allergies ?



25

Comment remédier à des oublis de pilule répétés ?



29

Que faire si on a des nausées quand on prend la pilule ?



33

Comment s'assurer de la qualité d'un préservatif acheté en grande surface ?



26

Pour qu'elle soit efficace, la pilule ne doit pas être oubliée pendant moins de 05, 12 ou 24 heures ?



30

Qu'est-ce que la pilule ?



34

Citez 3 lieux où l'on peut se procurer des préservatifs



35

Le préservatif peut-il diminuer le plaisir ?



39

Quelles précautions faut-il prendre lors de l'utilisation d'un préservatif masculin ?



43

On peut mettre un stérilet : n'importe quand, à partir de 30 ans ou après avoir déjà eu un enfant ?



36

Le préservatif peut-il se prendre dans le corps après un rapport sexuel ?



40

Que faire en cas d'accident de préservatif ?



44

La méthode Ogino est-elle efficace ?



37

Peut-on attraper une Infection Sexuellement Transmissible lorsque le préservatif se déchire ?



41

À quoi sont dus les accidents de préservatif ?



45

La pilule du lendemain est-elle efficace à 50 %, 95 % ou bien 100 % ?



38

Utilisé seul (sans pilule), le préservatif est-il efficace pour éviter une grossesse ?



42

Citez 3 moyens de contraception



46

Après un rapport non protégé, le délai maximum pour prendre la pilule du lendemain est : 24h, 72h, 5j ?



47

Comment se fait la prise de la pilule du lendemain ?



51

Où se met le stérilet ?



55

Qu'est-ce que l'implant ?



48

Comment agit la pilule du lendemain ?



52

À quel moment mettre le préservatif masculin ?



49

Dans quel cas prendre la pilule du lendemain ?



53

Comment utiliser l'anneau vaginal ?



50

Une goutte de sperme peut-elle suffire pour être enceinte ?



54

Comment utiliser le patch contraceptif ?



1

Peut-on avoir ses règles lorsque l'on est enceinte ?



3

Retrouve-t-on des cycles réguliers lorsqu'on arrête la pilule ?



7

À quoi sont dus les maux de ventre lors de la venue des règles ?



2

En prenant la pilule, est-ce normal de perdre moins de sang qu'auparavant ?



4

Est-il vrai qu'une femme stérile n'ait pas de règles ?



8

Après combien de jours de retard de règles doit-on commencer à penser à une grossesse ?



55

Que contient le sperme ?



5

Lorsque les règles sont irrégulières, est-il conseillé de prendre la pilule pour les régulariser ?



9

À quel âge en moyenne les filles ont-elles leurs premières règles ?



6

Des règles non régulières peuvent-elles être dangereuses ?



10

Le sang des règles provient-il de l'utérus, de la vessie ou bien des ovaires ?



11

Les règles durent-elles un jour, quelques jours ou un mois ?



15

Peut-on mettre des tampons lorsque l'on a jamais eu de relations sexuelles ?



19

Que faire en cas de saignement après avoir fait l'amour s'il ne s'agit pas d'un 1er rapport ?



12

Qu'est-ce que les règles ?



16

Est-ce qu'un oubli de pilule de plus de 3 jours peut déclencher des saignements ?



20

Est-ce normal pour une femme d'avoir des pertes blanches ?



13

Peut-on prendre un bain ou une douche quand on a ses règles ?



17

Que faire en cas de saignements en dehors des règles, alors qu'on prend la pilule ?



21

Le cycle féminin dure entre 20 et 25 jours, entre 25 et 30 jours ou bien entre 30 et 35 jours ?



14

Une femme a ses règles durant toute sa vie. Vrai ou faux ?



18

Peut-on avoir des pertes de sang après un 1er rapport sexuel ?



22

Est-ce normal pour une fille d'avoir des cycles irréguliers ?



23

L'ovulation a lieu 14 jours
avant les règles, 14 jours
après les règles ou au 1er jour
des règles ?



27

Qu'est-ce que l'hymen ?



31

Qu'est-ce que la puberté ?



24

Qu'est-ce que l'ovulation ?



28

Toutes les femmes ont
le même hymen.
Vrai ou faux ?



32

Qu'est-ce que la ménopause ?



25

Qu'est-ce que la stérilité ?



29

Citez 3 signes de la puberté
chez une jeune fille.



33

À quel âge en moyenne
survient la ménopause ?



26

Qu'est-ce que la virginité ?



30

La pilule du lendemain a-t-elle
une incidence sur le cycle
féminin ?



34

Chez une femme ménopausée,
combien d'ovules sont formés
par mois ?



35

L'acné est-elle une maladie contagieuse ?



39

Citez 3 signes de la puberté chez un jeune garçon.



43 - Par jour, l'homme

adulte forme-t-il :

100, 1000 ou 200 millions de spermatozoïdes ?



36

La pilule peut-elle supprimer l'acné ?



40

Le pénis est-il un muscle, un os ou bien un organe spongieux ?



44

Les oreillons peuvent rendre stérile.

Vrai ou faux ?



37

Comment appelle-t-on le moment où l'homme libère les spermatozoïdes ?



41

Qu'est-ce que l'érection du pénis ?



45

Lors d'une éjaculation, il y a de 2 à 4 millions, de 20 à 40 millions, de 200 à 400 millions de spermatozoïdes ?



38

La durée de vie maximale d'un spermatozoïde est-elle de quelques heures, 1 à 2 jours ou bien 4 à 5 jours ?



42

Est-il possible qu'une éjaculation se produise la nuit en dormant ?



46

Qu'est-ce que le sperme ?



47

Que deviennent les spermatozoïdes lorsqu'il n'y a pas d'éjaculation ?



51

Qu'est-ce que les pertes blanches ?



48

Qu'est-ce que la circoncision ?



52

Qu'est-ce que l'excision ?



49

Qu'est-ce que le décalotage ?



53

Une jeune fille peut-elle utiliser des tampons si elle est vierge ?



50

Qu'est-ce que l'andropause ?



54

Peut-on perdre les tampons à l'intérieur du corps ?



1

Un test de grossesse est-il fiable à 100 % ?



3

Comment se sent-on quand on est enceinte ?
Citez 3 signes possibles.



7

Qu'est-ce qu'une grossesse extra-utérine ?



2.1

Le test de grossesse doit-il se faire dès le premier jour de retard de règles ?



4

Combien de temps dure une grossesse humaine ?
36, 38 ou bien 41 semaines ?



8

Est-ce vrai qu'une femme enceinte a des envies ?



2.2

Le test de grossesse doit-il se faire 48 h après un rapport non protégé ?



5

Les rapports sexuels sont-ils déconseillés pendant la grossesse ?



9

Citez 2 endroits où on peut se procurer un test de grossesse.



2.3

Le test de grossesse doit-il se faire au moins 10 jours après un rapport non protégé ?



6

Quels examens peut-on faire pour savoir si on est enceinte ?



10

Une jeune mineure peut-elle demander un test de grossesse en pharmacie ?



11

À quoi sert un test de grossesse ?



15

Une absence de règles est-elle due à une grossesse ?



19

Après avoir arrêté tout moyen contraceptif, peut-on être immédiatement enceinte ?



12

Il est possible d'être enceinte dès le premier rapport sexuel. Vrai ou faux ?



16

Une femme enceinte peut-elle boire de l'alcool de temps en temps ?



20

Citez 2 risques encourus par le bébé si la femme enceinte fume du tabac ?



13 - Lors de la grossesse, l'embryon devient un fœtus à partir de 3, 9 ou 12 semaines ?



17

Est-ce dangereux de faire une fête bien arrosée pendant sa grossesse ?



21 - Quel est le risque pour un bébé si sa mère a consommé de la drogue pendant sa grossesse ?



14

Quel est le premier signe d'une grossesse ?



18

À quel moment du cycle faut-il avoir des relations sexuelles si l'on veut avoir un bébé ?



22

Le bébé a-t-il des chances de survivre à partir de 5, 6 ou bien 7 mois ?



23

Une femme enceinte peut-elle avoir ses règles ?



27

La pilule du lendemain est-elle remboursée par la Sécurité Sociale ?



31

Qu'est-ce que la périodurale ?



24

Quelle est la durée moyenne d'un accouchement pour un premier bébé :
2 h, 7 h ou 12 h ?



28

Quand une femme accouche, quelle partie du bébé sort en premier ?



32

Une fausse couche est l'arrêt de la grossesse avant que l'enfant soit viable, un accouchement avant terme ou une fausse alerte d'accouchement ?



25

Comment faire si on est enceinte et que notre ami ne veut pas de d'enfants ?



29

Une femme peut-elle être enceinte à n'importe quel moment, pendant l'ovulation ou pendant les règles ?



33

Peut-on faire une fausse couche sans s'en apercevoir ?



26

Le père doit-il toujours couper le cordon ombilical après la naissance ?



30

Qu'est-ce que la fécondité ?



34

Après une fausse couche, existe-t-il des risques pour les grossesses futures ?



35

Comment se passe une fausse couche ?



39

Un médecin ou un gynécologue peut-il refuser de donner suite à une demande d'avortement ?



43

Les ivg font-elles souffrir ?



36

Après une fausse couche, quel est le délai d'attente avant d'être à nouveau enceinte ?



40

Que signifie ivg ?



44

Quel est le délai pour avorter en France en 2011 ?



37

Combien de temps après l'arrêt de la pilule peut-on être enceinte ?



41

Comment se passe une ivg ?
Comment elle se déroule ?



45

Y a-t-il des risques de stérilité après une ivg ?



38

Les parents d'une jeune femme mineure peuvent-ils l'obliger à pratiquer une ivg alors qu'elle ne le veut pas ?



42

L'ivg est-elle dangereuse pour la santé ?



46

Peut-on avoir des rapports sexuels normaux après une ivg ?



47

Les parents d'une jeune fille mineure peuvent-ils lui refuser l'autorisation d'ivg alors qu'elle le souhaite ?



51

Pourquoi certaines personnes sont-elles contre l'avortement ?



55

À partir de quand l'embryon devient-il fœtus ?



48

L'ivg est-elle un moyen de contraception ?



52

Est-ce qu'avorter, c'est tuer un bébé ?



49

Peut-on avoir des enfants en ayant pris souvent la pilule du lendemain ?



53

Qu'est-ce qu'une mère porteuse ?



50

La pilule du lendemain est-elle un moyen de contraception ?



54

Qu'est-ce que l'accouchement sous X ?



1

Le délai légal pour avorter en France est de 10, 12 ou 15 semaines de grossesse ?



3

Quelles démarches effectuer si on envisage une ivg ?



7

De quelle année date la loi autorisant l'ivg en France ?



2

Pour se faire avorter, une jeune fille mineure a-t-elle besoin de l'accord de ses parents ?



4

Qui prend en charge l'ivg si la personne n'a pas d'argent et ne veut pas le dire à ses parents ?



8

Les ivg sont pratiquées dans un Centre de Planification, dans une structure médicale ou chez le gynécologue ?



55

Qu'est-ce que le voyeurisme ?



5

Où peut-on se renseigner pour un avortement ?



9 - Citez 3 services ou professionnels que l'on peut solliciter pour être conseillé après avoir eut des relations sexuelles sans protection ?



6

L'ivg est-elle remboursée par la Sécurité sociale ?



10

Peut-on se faire rembourser un test de grossesse pris en pharmacie ?



11

Peut-on aller au Centre de Planification et d'Éducation Familiale sans rendez-vous ?



15 - Pour une jeune fille mineure, la consultation dans un Centre de Planification et d'Éducation Familiale est gratuite. Vrai ou faux ?



19

Combien coûte en moyenne une plaquette de pilule ?



12

Qu'est-ce qu'un Centre de Planification et d'Éducation Familiale ?



16

Citez 2 lieux ou professionnels qui peuvent délivrer la pilule du lendemain.



20

Que dit la loi Neuwirtz ?



13

Peut-on aller voir un gynécologue quand on est mineure ?



17

Faut-il une autorisation parentale pour prendre la pilule quand on est mineure ?



21

Comment se passe la 1^e consultation gynécologique ?



14

La consultation gynécologique est-elle remboursée par la Sécurité sociale ?



18

Le médecin généraliste peut-il prescrire la pilule ?



22 - Un homme ayant des problèmes dans la sexualité peut-il consulter un Centre de Planification et d'Éducation Familiale ?



23

À qui s'adresser si on pense avoir un problème de stérilité ?



27

Citez 2 examens réalisés lors d'une consultation chez le gynécologue.



31

La pilule est un moyen de contraception donc ce n'est pas un médicament.
Vrai ou faux ?



24 - Le suivi gynécologique d'une jeune femme sous pilule doit se faire :
tous les 6 mois, tous les ans ou tous les 3 ans ?



28

À quoi sert un frottis du col de l'utérus ?



32

Un examen gynécologique complet est-il obligatoire pour une première demande de contraception ?



25

Un médecin qui prescrit la pilule à une jeune fille mineure peut-il avertir ses parents ?



29

Une jeune femme doit réaliser un frottis du col de l'utérus tous les 6 mois, tous les ans ou tous les 3 ans ?



33

Combien y a-t-il de comprimés dans une plaquette de pilules contraceptives ?



26

Si le gynécologue ne vous convient pas, pouvez-vous en changer facilement ?



30

À partir de quel âge est-il conseillé d'avoir un suivi gynécologique ?



34

Où est le Centre de Planification à Metz ?



35

Quelle est la différence entre un gynécologue et un obstétricien ?



39

Citez 2 lieux où on peut se procurer la pilule du lendemain ?



43

Combien coûte un préservatif masculin et un préservatif féminin ?



36

Toutes les pilules sont-elles remboursées par la Sécurité sociale ?



40

La pilule du lendemain est-elle en vente dans toutes les pharmacies ?



44

Y a-t-il différentes tailles de préservatifs ?



37

La pilule du lendemain est délivrée gratuitement en pharmacie pour les mineures. Vrai ou faux ?



41

La pilule du lendemain se présente sous la forme de 1, 2 ou bien 3 comprimés ?



45

Citez 2 lieux où l'on peut faire un test de dépistage gratuit du sida.



38

Une jeune femme mineure doit-elle demander l'accord parental pour obtenir la pilule du lendemain ?



42

La pilule du lendemain coûte entre 8-10 €, entre 13-16 €, entre 19-22 € ?



46

Citez le nom d'un service d'information sur le sida ayant un numéro vert (appel gratuit).



47

Quel est l'autre nom de la "pilule bleue" ?



51

Qu'est-ce qu'un aphrodisiaque ?



48

Qu'est-ce que le Viagra ?



52

Qu'est-ce que la chasteté ?



49

Qu'est-ce que le planning familial



53

Qu'est-ce qu'une ceinture de chasteté ?



50

Les numéros verts sont-ils visibles sur la facturation détaillée de France Télécom ?



54 - Peut-on attraper des Infections Sexuellement Transmissibles en pratiquant une fellation ou un cunnilingus ?



1

Qui aller voir en cas de viol, si on arrive pas à la dire à son entourage ?



3 - Un rapport sexuel qui a lieu sous l'effet de l'alcool alors que la jeune fille n'était plus en état de refuser peut-il être considéré comme un viol ?



7

Peut-on porter plainte à la place d'une personne qui a été violée ?



2 - La limite de temps pour dénoncer un viol incestueux s'il a eu lieu avant la majorité est 5 ans, 10 ans ou 15 ans ?



4 - La limite de temps pour dénoncer un viol incestueux s'il a eu lieu avant la majorité est 5 ans, 10 ans ou 15 ans ?



8

Comment faire constater un viol ?



55

Comment prévenir le cancer du col du l'utérus ?



5

Peut-on appeler "viol" une relation sexuelle forcée ?



9

Quelles démarches faire après un viol ?



6

Le viol est-il puni par la loi ?



10

En cas de viol, combien de temps a-t-on pour porter plainte ?



11

Quelle est la définition juridique du viol ?



15

Comment aider une personne qui a subi des violences sexuelles ?



19

Qu'est-ce que l'inceste ?



12

Devant la justice, un viol est classé dans la catégorie des infractions, des délits ou des crimes ?



16

Que faire pour aider quelqu'un victime d'agressions sexuelles ?



20

De combien de temps dispose-t-on pour porter plainte contre une exhibition sexuelle ou du harcèlement sexuel ?



13

Un garçon a été violé, il n'ose pas le dire, comment réagissez-vous ?



17

De combien de temps dispose-t-on pour porter plainte pour une agression sexuelle autre que le viol ?



21

Que signifie ist ?



14

Où peut-on aller lorsque l'on a subi des agressions sexuelles ?



18

L'exhibitionnisme est une agression sexuelle. Vrai ou faux ?



22

Oih, c'est le Virus de l'Immunodéficience Humaine, Very Important Human ou Virus Intra Hemoglobine ?



23

Être séropositif, c'est avoir un rhésus positif, avoir le sida ou être porteur du virus vih ?



27 - Combien de temps après un rapport sexuel peut-on faire un test de dépistage pour savoir si on est contaminé par le virus du sida ?



31

Peut-on attraper le sida en touchant une plaie d'une personne contaminée ?



24

Que signifie sida ?



28

Comment se transmet le vih ?



32

Peut-on attraper le sida lors d'une fellation ?



25

Qu'est ce que le vih ?



29

Citez 3 Infections Sexuellement Transmissibles ?



33

Peut-on avoir un rapport sexuel avec une personne ayant le sida ?



26

Comment peut-on savoir si on est séropositif sans pratiquer le test ?

Quels en sont les signes ?



30

Peut-on attraper le sida en embrassant un garçon ou une fille qui l'a ?



34

Pour quelle ist existe-t-il un vaccin ?



35

Peut-on être porteur d'une IST sans avoir de symptômes ?



39

Un jeune mineur peut-il demander à faire un test de dépistage sans l'autorisation de ses parents ?



43

Comment se transmet le virus de l'hépatite B ?



36

Où peut-on faire un test de dépistage du sida ?



40

Citez le nom d'une association engagée dans la lutte contre le sida



44

En 2011, il y a 100.000, 10.000 ou 25.000 malades du sida en France ?



37

Que faire quand on pense avoir une IST ?



41

Le risque de contamination de la mère à l'enfant pour une femme séropositive est de 25%, 50% ou bien 75% ?



45 - Le nombre de séropositifs dans le monde aujourd'hui est évalué à 500.000, 4 millions, 40 millions de personnes ?



38

La contamination par le VIH peut être provoquée par l'utilisation commune des sanitaires. Vrai ou faux ?



42

Un test de dépistage peut-il être imposé (par un médecin, un employeur) ?



46

Y a-t-il 1.000, 10.000 ou 6.000 nouveaux cas de VIH dépistés chaque année en France ?



47 - On peut détecter la présence du virus du sida dans le sang à partir de : 5, 15 ou 30 jours après contamination après l'infection ?



51

Est-ce qu'on prend un risque d'attraper le sida en faisant un piercing ou un tatouage ?



48

Les tests de dépistage du sida sont-ils pris en charge par la sécurité sociale ?



52

Le nombre d'ivg pratiquée chaque année en France est de 50.000, 120.000 ou 220.000 ?



49

Peut-on guérir du sida ?



53

Que risque-t-on si on injurie un(e) homosexuel(le) ou si on l'agresse parce qu'il (elle) est homosexuel(le) ?



50 - En France, une personne est contaminée par le vih : toutes les 2 heures, tous les jours, toutes les semaines ?



54

À quoi est dû le cancer du col de l'utérus ?



1

À qui peut-on se confier pour parler de ses relations sexuelles ?



3

Qu'est-ce que la frigidité ?



7

Que peut-on dire à un homme s'il insiste pour avoir des rapports alors qu'on en a pas envie ?



2

Qu'est-ce que l'homosexualité ?



4 - Lorsqu'une personne a été contrainte à une relation sexuelle, aura-t-elle des difficultés à se remettre avec quelqu'un d'autre ?



8

Un homme peut-il feindre de jouir ?



55

Pourquoi les jeunes filles ont-elles la vulve humide lorsqu'elles éprouvent du désir ?



5

Est-ce que la cohabitation avec son copain ou sa copine change le couple ?



9

Peut-on faire l'amour quand on a ses règles ?



6

Comment savoir si un homme ou une femme nous aime vraiment ?



10

Une fille peut-elle feindre un orgasme ?



11

Pourquoi tombons-nous amoureux ?



15

Doit-on être fidèle ?



19

Peut-on aimer quelqu'un sans vouloir de relations sexuelles ?



12

Est-il normal d'être attiré par quelqu'un d'autre quand on est déjà en couple ?



16

Comment la confiance se gagne dans une relation ?



20

Aujourd'hui quel est l'âge moyen des premiers rapports sexuels ?



13

Est-ce normal de ne pas toujours accepter que l'autre essaie de nous changer, "de nous modeler à sa façon" ?



17

Pourquoi certaines femmes sont frigides ?



21

Le plaisir est-il le même pour un homme que pour une femme ?



14

Doit-on toujours accepter quand notre ami(e) veut avoir un rapport sexuel ?



18

Peut-on aimer plusieurs personnes à la fois ?



22

À quoi reconnaît-on que l'on est amoureux ?



23

Est-il normal de ne pas éprouver de plaisir lors d'un premier rapport sexuel ?



27

Qu'est-ce que l'impuissance ?



31

À quel âge a-t-on un orgasme ?



24

Faut-il parler de sexualité avec ses parents ?



28

Qu'est-ce que l'éjaculation précoce ?



32

Qu'est-ce que le point g ?



25

Comment savoir que l'on est prêt(e) à vivre une relation sexuelle ?



29

Le premier rapport sexuel fait-il mal ?



33

Doit-on réaliser tous les fantasmes de son copain ou de sa copine ?



26

Comment faire pour que les parents prennent au sérieux la relation de leur enfant avec quelqu'un ?



30

Pourquoi certaines femmes n'ont pas le désir d'un rapport sexuel même avec celui qu'elles aiment ?



34

Qu'est-ce qu'un fantasme ?



35

Est-ce normal d'avoir des fantasmes ?



39

Qu'est-ce que l'amour platonique ?



43

Embrasser un garçon ou une fille contre sa volonté est-ce une agression sexuelle ?



36

Se masturber pour un homme ou pour une femme, est-ce naturel ?



40

Qu'est-ce qu'un orgasme ?



44

Se laisser aimer c'est ?
a tout donner
b risqué
c aimer déjà



37

Qu'est-ce qu'un bisexuel ?



41

Peut-on avoir peur de faire l'amour la première fois ?



45

Lors d'un rapport sexuel, si un garçon se retire avant l'éjaculation, y a-t-il un risque de grossesse ?



38

Comment s'appelle la déesse de l'amour chez les Grecs ?



42

La taille du sexe de l'homme a-t-elle de l'incidence sur le plaisir de la femme ?



46

Quelle est la différence entre homosexualité et pédophilie ?



47 - Comment faire accepter à nos parents une relation avec quelqu'un d'une autre culture quand ils ne sont pas d'accord ?



51
L'homosexualité est-elle héréditaire ?



48
Qu'est-ce que le sexisme ?



52
Si une personne a des attirances homosexuelles et a besoin d'en parler, à qui peut-elle s'adresser ?



49
Que signifie hétérosexualité ?



53
Entre filles lesbiennes, comment peut-on attraper le sida ?




50
Si votre meilleur(e) ami(e) ou un proche était homosexuel(le), en seriez-vous gêné(e) ?



54
Qu'est-ce que l'homophobie ?





Moyens de contraception et dérapages

- 1 - Oui, à condition de la prendre à heure régulière, sans oublier. En cas de vomissement dans les 3h après la prise, reprendre 1 comprimé.
- 2 - Pour vérifier le taux de cholestérol, glycémie et triglycérides (graisse et sucre dans le sang). B et C = non
- 3 - Non, c'est une prescription médicale personnalisée.
- 4 - Non, la pilule ne modifie pas le degré de fécondité qui est différent d'une femme à l'autre. Une grossesse peut survenir dès l'arrêt de la pilule ou parfois plusieurs mois après.
- 5 - Non, le généraliste comme le gynécologue prescrivent la pilule et effectuent la surveillance gynécologique et biologique.
- 6 - Faux. Il n'a pas été prouvé que la pilule faisait grossir. Lorsque cela arrive, il peut être conseillé de voir une diététicienne.
- 7 - Non, si on n'a pas oublié ou décalé sa pilule et si le préservatif n'a pas craqué.
- 8 - Non, il est souhaitable de continuer la pilule ou un autre moyen de contraception si l'on envisage d'avoir d'autres relations sexuelles, même occasionnelles.
- 9 - Oui. Elle discutera avec le médecin de la pilule la plus adaptée en fonction de son âge et de l'importance de sa consommation de cigarettes.
- 10 - Oui, dans les Centres de Planification et d'Éducation Familial pour les mineures et les non assurés sociaux, ainsi qu'au Planning Familial.
- 11 - Pour son efficacité et pour être sûre de ne pas l'oublier.
- 12 - Il n'y a pas d'âge légal, on peut prendre la pilule dès qu'on envisage d'avoir des rapports sexuels et que l'on ne veut pas être enceinte.
- 13 - Non, la pilule est délivrée en pharmacie sur ordonnance. Il faut donc préalablement consulter un gynécologue, un médecin généraliste ou un Centre de Planification et d'Éducation Familial.
- 14 - En allant dans un Centre de Planification et d'Éducation Familial qui délivre la pilule aux jeunes filles mineures qui le souhaitent. Et également chez le médecin généraliste qui est tenu de respecter le secret médical. La violation du secret médical est passible d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
- 15 - Quand on prend la pilule pour la première fois, le médecin demande d'attendre le premier jour des règles. À partir de ce jour là, on prend un comprimé chaque jour à la même heure. Si la plaquette comporte 21 comprimés, on prend ce comprimé durant 21 jours consécutifs, puis on fait un arrêt de 7 jours, et on recommence avec la plaquette suivante. Si la plaquette comporte 28 comprimés, on prend ce comprimé durant 28 jours consécutifs, on ne fait pas d'arrêt, et on recommence la deuxième plaquette.
- 16 - Non, si la pilule est prise régulièrement.
- 17 - Non, on peut prendre 2 pilules d'un coup si l'oubli est de 24h et on utilise des préservatifs. Si l'oubli est de plus de 24h, on laisse les comprimés oubliés, on finit la plaquette tout en utilisant des préservatifs. En cas de rapport durant la période d'oubli, certains préconisent de prendre aussi la pilule du lendemain.
- 18 - Non, mais il y a risque d'ist.
- 19 - Au moment qui est le plus régulier pour soi, cela dépend du rythme de chacun. Il est souvent conseillé d'associer la prise de pilule à un geste quotidien (brossage de dents, réveil...)
- 20 - Faux, mais il y a risque de grossesse au-delà de 12h d'oubli.
- 21 - Il est important de prendre le comprimé oublié le plus tôt possible dans un délai minimum de 24h, et de téléphoner ou consulter le plus rapidement possible (médecin, Centre de planification, service gynécologique de l'hôpital) pour savoir s'il y a un risque de grossesse.
- 22 - Non, si la plaquette précédant l'arrêt a été prise correctement.
- 23 - Oui, car dès que l'on arrête la pilule, l'ovaire peut fabriquer un ovule, et s'il y a rencontre avec un spermatozoïde, il y a grossesse. Il faut donc continuer à prendre la plaquette de pilule et utiliser des préservatifs lors des rapports jusqu'à la plaquette suivante.
- 24 - Non, si on met un préservatif, elle ne risque pas d'être enceinte.
- 25 - Il faut se discipliner en associant la prise de pilule à un geste quotidien. Il faut demander à son partenaire d'y penser avec soi. Si cela ne suffit pas, il est également conseillé de consulter soit un gynécologue, soit une conseillère de Centre de Planification et d'Éducation Familial ou un psychologue qui peuvent aider à identifier les raisons de ses oublis répétés. Il est également important d'envisager un changement de contraception.
- 26 - de 12h pour la plupart des pilules, mais à adapter selon le type de pilule (bien lire la notice).

Moyens de contraception et dérapages

- 27 - Non, il est conseillé de l'arrêter en fin de plaquette et de prendre un autre moyen contraceptif (préservatif, implant, stérilet), si cela est nécessaire.
- 28 - Au 1er jour des règles.
- 29 - Essayer de la prendre au cours d'un repas. Ces symptômes peuvent disparaître après quelques mois.
- 30 - C'est un médicament à base d'hormones que l'on prend chaque jour à l'heure fixe, ce qui empêche l'ovulation et donc une éventuelle grossesse.
- 31 - Oui, il protège de toutes les IST.
- 32 - Vrai, il s'agit d'une allergie au latex et dans ce cas il faut utiliser des préservatifs en vinyl.
- 33 - Grâce au sigle **NF** (norme française) et/ou **CE** (communauté européenne). Vérifier la date de péremption et l'intégrité du paquet.
- 34 - Pharmacie, distributeur, centre de planification, grandes surfaces, infirmerie scolaire, Planning familial.
- 35 - Chez certains oui, chez d'autres non.
- 36 - Il peut rester dans le vagin si le garçon ne le maintient pas quand il se retire, mais il ne peut pas se perdre. Le risque de grossesse et d'IST est alors plus important car le sperme se répand dans le vagin.
- 37 - Oui, la probabilité de transmission est faible mais réelle.
- 38 - Il n'est pas efficace à 100 % comme la pilule. Mais s'il est bien utilisé (mis à chaque rapport et pour toutes les pénétrations), s'il ne craque pas, ou s'il ne reste pas dans le vagin de la partenaire, c'est un moyen de contraception correct.
- 39 - Éviter de le détériorer en le retirant de l'emballage. Pincer le réservoir. Respecter le sens pour le dérouler sur le pénis en érection. Se retirer immédiatement après l'éjaculation en retenant le préservatif sur la base du pénis.
- 40 - Pour le risque de grossesse, il faut penser à la pilule du lendemain. Pour les IST, consulter pour avis et pour un éventuel dépistage.
- 41 - Aux mauvaises conditions de stockage et d'utilisation. À l'utilisation de produits gras non compatibles avec le préservatif (on peut utiliser des gels à l'eau).
- 42 - Préservatifs (masculin, féminin), pilule, stérilet, spermicides (doivent être utilisés avec les préservatifs, sont vendus en pharmacie sans ordonnance), implant, patch contraceptif, anneau vaginal.
- 43 - lorsque l'on a déjà eu un enfant le plus souvent mais possible si on n'a jamais eu d'enfant.
- 44 - Non, il y a 30 % d'échec.
- 45 - 95 % dans les 24 premières heures après le rapport. Son efficacité diminue avec le temps puisqu'elle est de 85 % dans les 24-48h et de 58 % dans les 48-72h.
- 46 - Le plus tôt possible après le rapport et jusqu'à 72h maximum.
- 47 - Elle se fait en un seul comprimé qui doit être pris le plus tôt possible et impérativement dans les 72h qui suivent le rapport sexuel. Au-delà des 72h, consulter un médecin. Plus la pilule du lendemain sera prise tôt, plus elle sera efficace (24-48h). Il est fortement conseillé de faire un test de grossesse 15j après la prise.
- 48 - Elle supprime ou recule l'ovulation, elle protège des rapports qui précèdent mais pas de ceux qui suivent. En conséquence, il est nécessaire d'utiliser un préservatif après l'avoir prise.
- 49 - Dans la cas où on a eu un rapport sexuel non protégé (non utilisation de la pilule ou du préservatif) ou quand le préservatif a craqué, s'il est resté dans le vagin de la partenaire.
- 50 - Oui, un seul spermatozoïde peut suffire et dans une goutte de sperme, il y a plusieurs millions de spermatozoïdes.
- 51 - Il s'agit d'un système que le gynécologue introduit dans l'utérus. Il peut être à base d'hormones ou de cuivre. Il est efficace pendant 3 à 5 ans.
- 52 - Sur le pénis en érection avant toute pénétration ou fellation.
- 53 - NuvaRing. Anneau de 5 cm de diamètre environ à insérer au fond du vagin. Laisse en place 3 semaines puis retrait 1 semaine (règles).
- 54 - Evra. Patch de 4 cm * 4 cm à coller sur la peau au niveau du bas-ventre, des fesses, du haut des bras, du haut du dos mais jamais sur les seins. À changer une fois par semaine pendant 3 semaines puis retrait 1 semaine (règles).
- 55 - Implanon. Petit bâtonnet en plastique contenant des hormones. Se place sous la peau du bras le premier jour des règles. Indolore et invisible. Reste en place pendant 3 ans.

Cycle féminin et corps humain

- 1 - Si l'on est enceinte, tout saignement doit amener à consulter. Les jeunes filles ont parfois des cycles irréguliers mais toute absence de règles chez une femme qui a une activité sexuelle doit faire penser à une grossesse.
- 2 - Oui car le fonctionnement ovarien est différent, ce qui fait que la muqueuse utérine se développe moins et les saignements sont moins abondants et moins longs.
- 3 - On retrouve les cycles que l'on avait avant la prise de la pilule.
- 4 - Faux, cela dépend de l'origine de la stérilité.
- 5 - C'est envisageable si on est gêné par l'irrégularité des cycles. Dans ce cas, on doit consulter un médecin libéral ou un gynécologue.
- 6 - Non, au début les cycles ne sont pas toujours réguliers, par la suite si une jeune fille a un retard de règles, elle doit penser qu'elle est peut-être enceinte.
- 7 - À des contractions de l'utérus pour évacuer la muqueuse utérine qui n'a pas servi car il n'y a pas eu fécondation.
- 8 - Il est possible de faire un test de grossesse dès les premiers jours de retard de règles.
- 9 - 12 ans en moyenne. Dans la majorité des cas, les règles surviennent entre 10 et 16 ans.
- 10 - De l'utérus qui évacue la muqueuse qui n'a pas servi à recueillir un éventuel œuf fécondé.
- 11 - Quelques jours (variable entre 2 et 8 jours selon les femmes).
- 12 - C'est l'élimination de la muqueuse utérine tous les 28j environ s'il n'y a pas eu implantation d'œuf dans l'utérus.
- 13 - Oui.
- 14 - Faux, il n'y a pas de règles jusqu'à la puberté (10-15 ans) et il n'y a plus de règles après le ménopause (45-55 ans).
- 15 - Oui si cela ne provoque ni inconfort ni douleurs.
- 16 - Oui, dans ce cas il s'agit d'une hémorragie de "privation" mais ce ne sont pas des règles.
- 17 - Il faut poursuivre la prise et aller voir son médecin qui pourra prescrire une pilule plus adaptée. Il faut vérifier qu'on a pas oublié un comprimé de la plaquette.
- 18 - Oui, chez la fille, lors du premier rapport sexuel, la rupture de l'hymen peut entraîner un saignement (mais pas toujours). Ensuite, toute perte de sang en dehors des règles nécessite une consultation médicale. - Oui, chez le garçon, si le frein qui retient le prépuce est trop court, il peut se rompre lors d'un rapport sexuel. Il est conseillé de consulter.
- 19 - Il est conseillé de consulter un médecin car il peut s'agir d'irritations, d'infections, ou de lésions qui nécessitent un traitement.
- 20 - Oui, ce sont des sécrétions physiologiques vaginales. Elles sont blanches, laiteuses, indolore, inodore. S'il y a modification de couleurs ou d'odeur, il faut consulter un médecin.
- 21 - Entre 25 et 30 jours.
- 22 - Oui, les cycles menstruels sont souvent irréguliers au début. Cependant s'il y a un rapport sexuel, un retard doit faire penser à une grossesse et amener à consulter.
- 23 - 14 jours avant d'avoir ses règles, mais il est impossible de savoir avec précision le moment exact de l'ovulation car les cycles réguliers sont très rares.
- 24 - C'est l'émission d'un ovule par l'ovaire tous les mois de la puberté à la ménopause.
- 25 - C'est ne pas pouvoir avoir d'enfant naturellement lors de rapports sexuels (que ce soit chez l'homme ou chez la femme). Cela peut se traiter dans la plupart des cas.
- 26 - C'est l'état d'une personne qui n'a jamais eu de rapport sexuel avec pénétration.
- 27 - Une membrane souple qui obture partiellement l'orifice vaginal.
- 28 - Faux, certaines femmes peuvent ne pas en avoir. Par ailleurs, la membrane sera plus ou moins souple selon les femmes.
- 29 - Apparition des seins (qui peuvent se développer jusqu'à 18 ans), apparition de la pilosité, apparition des règles, transformation de la morphologie (hanches), acné.
- 30 - Oui, la pilule du lendemain supprime ou retarde l'ovulation. Il est indispensable d'utiliser des préservatifs si l'on a des rapports sexuels après avoir pris la pilule du lendemain. Le cycle va ensuite reprendre normalement à l'arrivée des règles, il est alors souhaitable de commencer la pilule. La pilule du lendemain peut reculer les règles de 2 à 3 jours.

Cycle féminin et corps humain

- 31 - C'est le passage de l'enfance à l'âge adulte avec le développement des caractères sexuels secondaires et la maturité des organes génitaux.
- 32 - Il s'agit de la cessation de l'activité ovarienne pour une femme et donc l'arrêt définitif des règles. Cette période est variable d'une femme à l'autre et intervient autour de 50 ans.
- 33 - Autour de 50 ans.
- 34 - J'évo, car la ménopause est l'arrêt définitif de l'ovulation.
- 35 - Non, l'acné est lié à la puberté et est due à un excès d'hormones.
- 36 - Il existe des pilules proposées aux jeunes filles pour diminuer leur acné.
- 37 - L'éjaculation.
- 38 - De 4 à 5 jours.
- 39 - Changement de la voix, apparition de la pilosité, transformation morphologique (carrure, musculature), acné, éjaculation nocturne, augmentation de volume des organes génitaux externes.
- 40 - C'est un organe spongieux.
- 41 - C'est un afflux de sang au niveau de la verge (corps caverneux) qui provoque une augmentation de volume et une rigidité.
- 42 - Vrai, il s'agit d'éjaculations nocturnes très fréquentes chez les jeunes hommes.
- 43 - 200 millions de spermatozoïdes par jour environ.
- 44 - Vrai, cela concerne les hommes quand ils ont une complications des oreillons pouvant provoquer une orchite (inflammation du testicule).
- 45 - Entre 200 et 400 millions.
- 46 - C'est un liquide constitué du liquide séminal (milieu nourricier) et de spermatozoïdes (cellules reproductrices) qui est émis par urètre au moment de l'éjaculation.
- 47 - Ils sont détruits par les globules blancs.
- 48 - C'est une intervention chirurgicale qui consiste à enlever la peau qui recouvre le gland : le prépuce. Cela se pratique pour des raisons religieuses, culturelles ou médicales.
- 49 - C'est l'action de faire coulisser le prépuce qui le gland afin d'enlever les sécrétions qui s'y déposent, d'où la nécessité d'une toilette quotidienne.
- 50 - C'est l'ensemble des transformations physiques et psychiques qui se manifestent chez l'homme entre 55 et 70 ans.
- 51 - Ce sont des sécrétions vaginales plus ou moins importantes selon les personnes et les périodes de la vie. C'est une production naturelle du corps pour humidifier le vagin. Elles peuvent être signes d'infection si augmentation de l'abondance, colorées, malodorante, brûlures, démangeaisons : il faut alors consulter.
- 52 - C'est une mutilation sexuelle interdite en France et punie par la loi. Cela consiste à couper le clitoris d'une petite fille pour des raisons culturelles et religieuses.
- 53 - Oui. Les tampons s'introduisent dans le vagin par le biais de l'ouverture de l'hymen qui permet aux règles de s'échapper du corps. On peut les utiliser dès les premières règles.
- 54 - Non, l'orifice de communication entre l'utérus et le vagin est beaucoup trop petit.
- 55 - Des spermatozoïdes produits par le testicule. Du liquide séminal produit par la vésicule séminale et la prostate (nourriture).

Grossesse

- 1 - Le test urinaire est fiable dès la 1^e semaine de retard de règles. Les tests sanguins peuvent être réalisés avant même le retard de règles (au minimum 10j après le rapport supposé)
- 2 - Dès le 1^{er} jour de retard de règles. Il sera ensuite à refaire si les règles ne sont pas apparues dans les 8j.
- 3 - Absence de règles, nausée, fatigue, seins plus volumineux. Pour confirmer un signe, un test de grossesse, une prise de sang ou une échographie peuvent être demandées.
- 4 - 9 mois ou 41 SA (absence de règles). En moyenne, le début de grossesse est déterminé à partir du 1^e jour des dernières règles.
- 5 - Non, si les partenaires le désirent (les contre-indications médicales sont très rares).
- 6 - Examen clinique, le test de grossesse (urinaire) délivré en pharmacie et gratuit dans les CPEF, la prise de sang, l'échographie.
- 7 - Un œuf fécondé qui s'implante en dehors de l'utérus (le plus souvent dans la trompe).
- 8 - Oui, cela peut arriver.
- 9 - Dans les CPEF (gratuit), en pharmacie (payant), dans certaines grandes surfaces (payant), auprès des infirmières scolaires (gratuit).
- 10 - Oui, mais elle le paiera. Il est gratuit dans les CPEF.
- 11 - À diagnostiquer une grossesse en recherchant des hormones (bêta HCG) dans les urines et le sang.
- 12 - Vrai, un moyen de contraception est indispensable pour éviter tout risque de grossesse.
- 13 - À partir de 3 mois de grossesse.
- 14 - L'absence de règles.
- 15 - Oui, c'est possible. Pour le savoir il faut consulter rapidement (médecin, centre de planification) et faire un test.
- 16 - Non. On préconise aujourd'hui l'abstinence totale pendant la grossesse car on sait que l'alcool peut être dangereux pour le fœtus : une quantité d'alcool que la mère élimine en quelques heures sera éliminée en plusieurs jours par l'embryon ou le fœtus. Et pendant ce temps-là se forment les organes et les tissus, notamment le système nerveux central très sensible aux toxiques.
- 17 - Oui, une seule prise importante d'alcool pendant la grossesse peut faire beaucoup de dégâts. Car l'alcool passe très facilement la barrière placentaire. Cela peut amener un accouchement prématuré mais aussi un retard intellectuel, des troubles psychomoteurs ou du comportement chez le futur bébé.
- 18 - Pour concevoir un bébé, il faut avoir des relations sexuelles au moment de l'ovulation. Celle-ci peut avoir lieu à n'importe quel moment du cycle.
- 19 - Oui.
- 20 - Avortement spontané ou fausse couche spontanée, hématome rétro placentaire, accouchement prématuré, rupture prématurée des membranes avant terme, bébé plus petit.
- 21 - Les conséquences sont différentes suivant les catégories de drogues. La cannabis : aucune malformation n'a été décelée, mais fumer pendant la grossesse nuit à l'oxygénation du bébé. Les hallucinogènes (LSD, ecstasy, acides) : des traces de drogues sont se concentrer dans le lait maternel. La cocaïne (coca, crack) : risque d'avortement spontané et de décollement placentaire, poids du bébé inférieur à la moyenne, malformations urogénitales et convulsions. Les opiacées (opium, morphine, héroïne) : les bébés présentent pendant 10 semaines un effet de manque mais on est dans l'incapacité de dire si ces bébés développeront une toxicomanie à l'âge adulte.
- 22 - 6 mois.
- 23 - Non, mais elle peut avoir des pertes de sang anormales en début de grossesse qui nécessitent une consultation.
- 24 - 12h, mais ce n'est qu'une moyenne, la durée d'un accouchement est très variable d'une femme à l'autre.
- 25 - En parler avec lui, avec des proches ou des professionnels qualifiés (assistante sociale, infirmière scolaire, conseillère de CPEF...) et faire son propre choix.
- 26 - C'est un geste souvent proposé au père au moment de l'accouchement mais il n'est pas obligé de le faire.
- 27 - Non, mais elle est délivrée gratuitement dans les CPEF, dans les infirmeries scolaires et dans les pharmacies pour les mineures.
- 28 - Le tête le plus souvent et parfois les fesses.

Grossesse

- 29 - Elle peut être enceinte au moment de l'ovulation qui peut avoir lieu à n'importe quel moment du cycle.
- 30 - C'est l'aptitude pour un être humain à se reproduire.
- 31 - C'est une anesthésie loco-régionale souvent proposée avant l'accouchement afin d'atténuer les douleurs liées aux contractions utérines durant l'accouchement.
- 32 - L'arrêt d'une grossesse avant que l'enfant soit viable c'est-à-dire durant les 3 premiers mois.
- 33 - Oui, une femme peut faire une fausse couche précoce sans s'en apercevoir. En effet, les saignements abondants peuvent être confondus avec des règles.
- 34 - Non, une autre grossesse peut se dérouler tout à fait normalement.
- 35 - Le plus souvent spontanément : contractions utérines et pertes de sang. Parfois le gynécologue doit pratiquer un curetage.
- 36 - Il n'y en a pas, on peut re débuter une grossesse quand on le souhaite.
- 37 - Dès l'arrêt de la pilule. Le plus souvent, la grossesse débute dans les mois qui suivent.
- 38 - Non, une jeune fille mineure peut poursuivre une grossesse contre l'avis de ses parents. Dans ce cas, il existe des solutions d'accueil et de protection de la jeune fille durant la grossesse.
- 39 - Non. Un médecin ou un gynécologue peut refuser de pratiquer l'avortement, mais il doit informer la patiente de ses droits et l'orienter vers d'autres médecins et structures (et ce quelques soient ces convictions).
- 40 - Interruption volontaire de grossesse.
- 41 - Soit par la méthode médicamenteuse. Soit par la méthode chirurgicale (aspiration), sous anesthésie générale ou locale. Dans les 2 cas cela nécessite une courte hospitalisation.
- 42 - Non, si elle est faite dans un milieu médicalisé.
- 43 - Non, la méthode chirurgicale se fait sous anesthésie. La méthode médicamenteuse donne des contractions qui peuvent être douloureuses mais elles peuvent être calmées par des antalgiques.
- 44 - 12 semaines de grossesse soit 14 semaines d'aménorrhée calculées à partir du premier jour des dernières règles.
- 45 - Non si elle est pratiquée en milieu médicalisé.
- 46 - Oui, mais il faut utiliser une contraception si on ne veut pas être enceinte de nouveau.
- 47 - Non, une jeune fille peut entreprendre une IVG même si ses parents s'y opposent. Dans ce cas, elle devra se faire accompagner dans sa démarche par une personne majeure de son choix.
- 48 - Non car la femme est déjà enceinte, l'IVG signifie interruption volontaire de grossesse. La contraception est l'ensemble des moyens réversibles pour éviter les grossesses.
- 49 - La pilule du lendemain est une contraception d'urgence, elle n'est pas faite pour être prise souvent. Toutefois elle n'empêchera pas les grossesses futures.
- 50 - Oui, néanmoins ce n'est pas une solution à long terme d'utiliser la contraception d'urgence comme contraception habituelle. Les doses sont plus importantes et surtout c'est moins efficace que de prendre la pilule régulièrement.
- 51 - Souvent du à une croyance morale ou religieuse. Pour beaucoup, la grossesse représente la possibilité d'une nouvelle vie humaine et l'idée de mettre fin à cette possibilité les bouleverse. Débat autour de la question de savoir quand commence la vie. Les personnes contre l'avortement considèrent que la vie commence au moment où l'ovule est fécondé par le spermatozoïde.
- 52 - Bonne question. Jusqu'à 8 semaines si le fœtus naissait, il n'aurait aucune chance de survivre. Il n'a aucune caractéristique humaine identifiable : il ne ressemble pas à un bébé. Potentiel pour devenir un être humain. Entre 8 et 12 semaines, quand l'embryon devient fœtus avec une forme humaine, l'avortement peut être plus difficile encore à accepter. Les femmes ont besoin d'aide et de soutien pour prendre la décision qui leur convient à elles.
- 53 - C'est une femme qui porte un bébé à la place d'une femme stérile. Elle conçoit un enfant avec leur mari ou avec celui de la femme stérile et le porte pendant 9 mois. Après l'accouchement, elle donne le nouveau-né au couple stérile. C'est une situation très compliquée, interdite en France.
- 54 - C'est une femme qui accouche dans le secret à la maternité et qui laisse son enfant pour qu'il soit adopté.
- 55 - À 3 mois. L'embryon a pris forme humaine, il mesure 12 cm et pèse environ 65 g.

Informations pratiques

- 1 - 12 semaines de grossesse ou 14 SA (aménorrhée : calculée à partir du 1er jour des dernières règles).
- 2 - Non, elle peut agir à l'insu de ses parents. Cependant le médecin lui conseillera d'en parler avec ceux-ci dans son intérêt. Si malgré tout elle décide de garder le secret, elle devra se faire accompagner dans sa démarche par la personne majeure de son choix.
- 3 - Une consultation médicale est nécessaire pour constater la grossesse. Un délai de réflexion de 8j est obligatoire pendant lequel sera réalisé l'entretien pré-IVG (pour les mineures) auprès d'une conseillère conjugale ou d'une assistante sociale. L'IVG sera ensuite réalisée dans une structure médicalisée.
- 4 - Une demande de prise en charge peut être faite auprès de l'assistante sociale qui intervient auprès de la Sécurité sociale.
- 5 - CPEF, Urgences gynécologiques de l'hôpital, maternité, médecin traitant, gynécologue, infirmière scolaire, assistante sociale.
- 6 - L'IVG est remboursée à 80 % par la Sécurité sociale et à 20 % par les mutuelles. Cependant, si une jeune personne (mineure ou majeure) ne veut pas ou ne peut absolument pas mettre ses parents au courant de l'IVG, elle doit se renseigner auprès du CPEF ou du service social pour faire une demande de remboursement à 100 % par la Sécurité sociale avec souhait de confidentialité (loi de juillet 2001).
- 7 - De 1975, il s'agit de la loi Veil.
- 8 - Dans une structure médicalisée (hôpital ou clinique).
- 9 - Le CPEF, les urgences gynécologiques hospitalières, le médecin traitant, le gynécologue, l'infirmière scolaire, le pharmacien.
- 10 - Non, par contre, ils sont délivrés gratuitement dans les CPEF et éventuellement dans certaines infirmerie scolaire.
- 11 - Oui, pendant les heures d'ouverture du centre.
- 12 - C'est un lieu d'écoute, de consultation et d'information gratuit pour aborder les questions liées à la sexualité et à la famille. C'est un lieu ouvert à tous et plus particulièrement aux mineurs qui souhaitent obtenir un moyen de contraception, diagnostiquer une grossesse, faire un dépistage d'IST.
- 13 - Oui. Si il s'agit d'un gynécologue privé, la consultation sera payante. Elle sera gratuite dans un CPEF.
- 14 - Oui, la consultation est remboursée à 80 %. La mutuelle s'il y en a une, rembourse le complément. Les consultations dans les CPEF sont gratuites.
- 15 - Vrai.
- 16 - CPEF, pharmacien, gynécologue (cabinet privé ou à l'hôpital), médecin traitant, infirmière scolaire.
- 17 - Non, une jeune fille mineure peut prendre la pilule sans l'accord de ses parents. Les CPEF la délivre gratuitement dans ce cas.
- 18 - Oui, le généraliste peut prescrire la pilule et assurer les surveillances gynécologiques et biologiques.
- 19 - Entre 3 et 10 euros. Certaines sont remboursées, d'autres non. Non remboursées : entre 8 et 10 euros la plaquette. Remboursées : 3 euros.
- 20 - C'est la loi qui légalise la contraception en France, elle date de 1967.
- 21 - Il y a d'abord une discussion avec le médecin sur la santé de la jeune fille et les antécédents dans sa famille. L'examen gynécologique n'est pas réalisé systématiquement la première fois. L'examen gynécologique comporte une palpation des seins, un examen du col utérin grâce à un spéculum et éventuellement un frottis et un toucher vaginal. La jeune fille peut profiter de la consultation pour aborder toutes ses questions.
- 22 - Oui, les CPEF sont ouverts à tous. Il peut aussi en parler à son médecin traitant ou à un urologue.
- 23 - Il faut s'adresser à un gynécologue qui pourra effectuer un bilan.
- 24 - Tous les ans en l'absence de symptômes.
- 25 - Non, car il est tenu au secret professionnel. La violation du secret médical est passible des peines suivantes : 1 an de prison et 15 000 euros d'amende.
- 26 - Oui.

Informations pratiques

- 27 - La pesée, la palpation des seins, la prise de tension, éventuellement le toucher vaginal et le frottis du col de l'utérus.
- 28 - À dépister le cancer du col de l'utérus.
- 29 - Tous les 3 ans.
- 30 - Il n'y a pas d'âge, il devient systématique dès que l'on utilise la pilule ou une autre contraception. Il est conseillé dès les premiers rapports sexuels.
- 31 - Faux, la pilule est un médicament, elle doit être prescrite par un médecin.
- 32 - Non, la première demande de contraception nécessite surtout un entretien d'information, un interrogatoire médical pour éliminer les contre-indications. Le premier examen gynécologique aura lieu dans les mois qui suivent à condition que la jeune fille ait eu des rapports sexuels et se sente prête.
- 33 - 21 ou 28, en sachant que la plupart des pilules contraceptives contiennent 21 comprimés.
- 34 - À l'hôpital maternité de Metz (Ste Croix).
- 35 - Le gynécologue est un médecin spécialiste de l'appareil génital féminin. S'obstétricien est un médecin spécialiste de l'appareil génital féminin mais aussi de la grossesse et de l'accouchement.
- 36 - Non, les pilules ne sont pas toutes remboursées par la Sécurité sociale. Il importe donc d'en parler avec le médecin qui la prescrit.
- 37 - Vrai, la pilule du lendemain est délivrée sans ordonnance dans les pharmacies et est gratuite pour les mineures depuis 2001.
- 38 - Non.
- 39 - Dans les CPEF, les urgences gynécologiques hospitalières, les maternités, les pharmacies (sans ordonnance), auprès du médecin traitant, du gynécologue et des infirmières scolaires.
- 40 - Oui, et délivrée sans ordonnance.
- 41 - Depuis 2005, il n'y a plus qu'un seul comprimé qui est à prendre le plus tôt possible après le rapport sexuel.
- 42 - Environ 8 euros.
- 43 - Le préservatif masculin entre 40 et 80 centimes. Le préservatif féminin entre 2 et 3 euros.
- 44 - Oui, il existe différentes tailles, mais les tailles standards sont extensibles donc elles conviendront à la grande majorité des utilisateurs.
- 45 - Les CPEF, les centres de dépistages anonymes (CDA) dont certains sont gratuits (CDAG).
- 46 - SIDA info service 0800 840 800. Fil santé jeunes 0800 235 236. Drogue info service 0800 23 13 13 ou 01 70 23 13 13. Les numéros en 0800 sont gratuits à partir d'une ligne fixe et coûtent le prix d'un appel ordinaire à partir d'un portable.
- 47 - Viagra.
- 48 - Le Viagra est un médicament prescrit par le médecin et destiné aux hommes qui ont de troubles de l'érection. Le Viagra permet de retrouver une sexualité épanouissante. Comme c'est un médicament, il ne doit être pris que sur avis médical et comporte des contre-indications.
- 49 - C'est une association militante qui défend le droit de chacun à une sexualité choisie librement. On trouve des centres de planning familial dans presque tous les départements.
- 50 - Les numéros verts gratuits commençant par 0800 ne sont pas visibles. Ces numéros peuvent aussi être appelés d'une cabine sans avoir de carte. Par contre, ils sont payants à partir d'un portable.
- 51 - C'est une substance ou un moyen censé stimuler le désir sexuel. Certaines substances alimentaires ont un effet plus ou moins immédiat sur l'organisme : vasodilatation (augmentation du débit sanguin, gorge les organes sexuels de sang), déinhibition (altération des fonctions de contrôle et de vigilance, sensation d'euphorie, impression de plus de confiance en soi), excitant. Exemple : gingembre, épices, chocolat.
- 52 - C'est une abstinence sexuelle durable généralement volontaire. C'est-à-dire rester loin de toute forme de pratiques sexuelles (pénétration, fellation). Ce choix est déterminé par religion ou éducation.
- 53 - C'est une ceinture en fer avec une serrure que l'on portait comme une culotte fermée à clef. Elle était censée protéger les femmes des désirs sexuels des autres hommes pendant l'absence de leur mari guerrier.
- 54 - Vrai. On peut transmettre l'herpès, le sida si il y a des saignements.
- 55 - C'est aimer être spectateur, aimer regarder les autres faire l'amour ou se déshabiller sans forcément y participer.

Situations à risques et ist

- 1 - CPEF, CIDF (Centre d'information des droits de la femme), numéro vert SOS viol info 0800 05 95 95, toute autre personne liée par le secret professionnel (Assistante sociale, infirmière, médecin, sage-femme)
- 2 - 20 ans après la majorité, soit jusqu'à l'âge de 38 ans maximum. _____ 3 - Oui, il y a viol dès que l'un des deux n'est pas consentant.
- 4 - 10 ans à compter du jour où le crime a été commis.
- 5 - La loi définit le viol ainsi : "tout acte de pénétration sexuelle, quelle que soit la nature, commis sur la personne d'autrui, par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol". Les agressions sexuelles autre que le viol tels les attouchements sexuels (c'est-à-dire sans pénétration) sont également réprimés par la loi. Et toutes les agressions sexuelles sont passibles de prison quelque soit le contexte. La pénétration sexuelle est ce qui distingue le viol des autres agressions sexuelles (la pénétration pouvant être vaginale, anale ou orale, ou pénétration sexuelle par la main ou des objets).
- 6 - Oui, il s'agit d'un crime jugé aux Assises. Il est donc passible de prison. De plus, il existe des circonstances aggravantes. Par exemple, si le viol est commis : sur un mineur de moins de 15 ans, sur une personne ayant une déficience physique ou psychique, sur une femme enceinte, sur un ascendant ou une personne ayant autorité sur la victime, à cause de l'orientation sexuelle de la victime, si la victime a été mise en contact avec l'auteur des faits par un réseau de télécommunication . . .
- 7 - Non, si la victime est adulte, on ne peut pas porter plainte à sa place, mais on peut l'accompagner, l'inciter à le faire et à dénoncer le violeur s'il est connu. C'est différent si la victime est mineure. Dans ce cas, il y a une obligation d'assistance et de protection. On doit alerter les services de police, de gendarmerie, les services sociaux pour signaler le mineur est ou a été agressé.
- 8 - Par un examen médical réalisé aux urgences gynécologiques hospitalières ou auprès d'un médecin.
- 9 - Se rendre aux urgences gynécologiques hospitalières ou auprès d'un médecin pour faire un examen médical et ensuite à la police pour porter plainte. Enfin il faut demander un accompagnement psychologique.
- 10 - 10 ans après le viol si celui-ci a été commis après la majorité. 20 ans après la majorité si le viol a été commis avant la majorité. Il est préférable que des constatations médicales aient eu lieu mais ce n'est pas une obligation au sens strict de la loi.
- 11 - "Tout acte de pénétration sexuelle de quelque nature que ce soit commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol". Selon la loi, le viol est considéré comme un crime et est donc jugé aux Assises.
- 12 - Le viol avéré est classé dans la catégorie des crimes et sera jugé en Cour d'Assises. _____ 13 - Les garçons peuvent aussi être victimes de viol.
- 14 - CPEF et aux urgences gynécologiques hospitalières (ou maternité) ou chez le médecin pour se faire délivrer un certificat médical. Au commissariat de police ou à la gendarmerie pour porter plainte.
- 15 - En l'invitant à parler et à solliciter un accompagnement psychologique.
- 16 - L'écouter, ne pas juger et l'inviter à porter plainte, car une agression sexuelle est une atteinte très grave à l'intimité d'une personne.
- 17 - 3 ans pour les victimes majeures. 10 ans à compter de la majorité si la victime est mineure. 20 ans à compter de la majorité si la victime est mineure et qu'il y a des circonstances aggravantes, par exemple si l'agression a été commise par un ascendant ou par toute autre personne ayant autorité sur la personne.
- 18 - Vrai.
- 19 - C'est une relation sexuelle (ou des attouchements) imposée à un enfant par son père ou sa mère ou par un autre membre de sa famille (frère, sœur, oncle, tante, grands-parents, beaux-parents . . .). La loi punit sévèrement l'adulte qui a ce type de pratique avec l'enfant ou l'adolescent considérée comme sa victime. Les victimes sont perturbées. Il est indispensable qu'elles ne restent pas avec ce secret. Elles peuvent s'adresser à un adulte proche et ouvert, à un médecin ou à un psychologue. Elles peuvent aussi s'orienter vers un Point Accueil Ado.
- 20 - 3 ans à partir des faits.
- 21 - Infection Sexuellement Transmissible. _____ 22 - Virus de l'ImmunoDéficiency Humaine.
- 23 - Être porteur du virus du VIH. Ce qui signifie que l'on a été en contact avec le virus et que l'organisme réagit à l'infection en fabriquant des anticorps spécifiques.
- 24 - Syndrome d'ImmunoDéficiency Acquis. C'est la forme la plus grave de l'infection par le VIH.
- 25 - C'est un virus qui affaiblit le système de défense de l'organisme.

Situations à risques et ist

26 - Il n'y a pas de signes visibles. Pour le savoir, il faut faire un test.

27 - Si vous avez pris un risque il y a moins de 48h (rapport sexuel sans préservatif avec une personne dont vous ne savez pas si elle est séronégative, préservatif déchiré durant le rapport, partage de matériel d'injection lors d'un usage de drogue), rendez-vous le plus tôt possible aux urgences d'un hôpital, si possible avec votre partenaire, en vue d'un traitement pouvant réduire la contamination. On peut savoir 15 jours après la prise de risque si on est contaminé(e) par le virus du sida. Ce n'est que 3 mois après la prise de risque qu'on peut être certain de ne pas être contaminé par le virus du sida.

28 - Par les rapports sexuels (sperme, sécrétions vaginales et cervicales). Par le sang (échange de seringues souillées entre toxicomanes). Par la transmission in utero de la mère à l'enfant. Le risque transfusionnel est quant à lui considérablement réduit.

29 - Sida, hépatite B, syphilis, gonococcie, herpès génital, condylomes, chlamydiae, mycoplasmes, mycoses, trichomonas.

30 - Non, car la salive ne contamine pas (sauf si lésions).

31 - Oui, seulement si on a soi-même des lésions sur la peau. _____ 32 - Oui, si l'on a une plaie dans la bouche et que le partenaire est séropositif.

33 - Oui, en utilisant un préservatif (masculin ou féminin). _____ 34 - L'hépatite B.

35 - Oui, le sida, l'hépatite B et le chlamydiae notamment ne résistent pas toujours de symptômes immédiats.

36 - Dans un CPEF. Dans un centre de dépistage anonyme (CDA) et les centres de dépistages anonyme et gratuit (CDAG). Dans les laboratoires, avec l'ordonnance d'un médecin (pour pouvoir être remboursé).

37 - Aller consulter soit un généraliste, soit un dermatologue ou un gynécologue, ou se rendre dans un centre de dépistage du sida et surtout ne pas attendre.

38 - Faux. _____ 39 Oui, l'autorisation parentale n'est pas une obligation pour faire cette démarche.

40 - AIDES, ACTUP, "Ensemble contre le sida"...

41 - De 25 % sans traitement. Il peut être réduit à moins de 10 % si une tri-thérapie est instituée précocement pendant la grossesse, et si la femme n'allait pas.

42 - Non, le test de dépistage relève d'une démarche volontaire mais il est normal pour un médecin de le proposer dans l'intérêt du patient et de sa santé.

43 - Par le sang, le sperme, la salive.

44 - 25 000 personnes. Mais le nombre de personnes séropositives non atteintes du sida s'élèvent en France à 120 000 (2004).

45 - 40 millions (2004).

46 - 6 000. Mais tous les cas de séropositivité ne sont pas dépistés, parce que toutes les personnes porteuses du virus ne font pas de test de dépistage. Il existe des centres de dépistages (CDAG) dans tous les départements, ainsi que dans de nombreux centres de planification.

47 - A partir du 15e jour. Il est nécessaire de faire un second test de dépistage au bout de 3 mois.

48 - Oui, ils sont pris en charge à 100 % lorsqu'ils sont prescrit par un médecin mais on peut faire un test dans les centres de dépistages anonymes et gratuits.

49 - Non, il n'existe pas de traitement curatif. Il existe un traitement qui ralentit la progression du virus.

50 - Toutes les 2 heures.

51 - Oui, il y a un risque si on ne le fait pas chez un professionnel qui respecte la charte (utilisation d'un matériel stérile à usage unique).

52 - 220 000 (2004).

53 - Injurier ou agresser quelqu'un est toujours un délit. Si ce délit est commis du fait de l'homosexualité de la victime, cela sera toujours considéré comme un facteur aggravant la peine, même si le délit a été passé dans le cadre privé.

54 - HPV : Papillomavirus. Transmission sexuelle possible dès l'adolescence. Le plus souvent bénin et éliminé par l'organisme mais peut parfois provoquer des lésions précancéreuses au niveau de la sphère génitale qui évolue jusqu'au cancer.

55 - Frottis cervical réguliers tout les 3 ans. Vaccin à partir de 14 ans avant le premier rapport sexuel ou entre 15 et 21 ans dans l'année qui suit le premier rapport sexuel. 3 injections : M0, M2, M6.

Relations amoureuses et sexualité

- 1 - À toute personne avec qui on se sent libre (parents, sœur, frère, ami) ou à certains professionnels (médecin, conseillère de CPEF) et aux numéros verts (Fil santé jeune, Info contraception).
- 2 - C'est l'attraction sexuelle entre personnes de même sexe. L'homosexualité se conjugue au masculin ou au féminin. Elle s'impose aux personnes. Il est souvent difficile de l'accepter. À l'adolescence, on peut arriver à des pratiques homosexuelles sans être homosexuel.
- 3 - C'est ne pas éprouver de plaisir au moment des caresses et des rapports sexuels.
- 4 - La contrainte est toujours une chose négative car celui qui la subit n'est plus sujet de son histoire, il devient objet de l'autre. Les conséquences peuvent être : la peur de nouvelles rencontres et donc difficultés à créer de nouveaux liens. Le rejet de la situation traumatisante donc la personne se repositionne en objet et répond au désir de l'autre au détriment du sien propre. L'agressivité envers toute autre personne susceptible de contraindre à nouveau. Cependant si la personne a réfléchi sur la situation, a pu parler à quelqu'un, tout peut renaître) nouveau.
- 5 - Oui car il faut alors partager les bons et les mauvais moments. Il faut aussi accepter de voir l'autre comme il est et se montrer soi-même sans fard. S'il y a respect mutuel, la relation peut être encore plus profonde.
- 6 - Si ses actes correspondent à ses paroles, s'il prend en compte le plaisir et le bonheur de l'autre, s'il vous rend encore plus vous-même et s'il ou elle semble heureux.
- 7 - Que le désir et le plaisir sont des choses tellement importantes qu'elles ne peuvent se partager qu'avec l'assentiment des deux partenaires.
- 8 - Oui, mais c'est plus difficile qu'une femme, puisque la présence ou l'absence d'érection est un signe important de jouissance.
- 9 - Oui, si cela convient aux deux partenaires. Tout dépend comment chacun vit ce moment. Il faut se rappeler cependant qu'il y a un risque maximum de transmission d'ist s'il n'y a pas de préservatif.
- 10 - Oui, mais elle n'a rien à gagner à le faire. Il est préférable qu'elle exprime son ressenti de la façon la plus honnête possible, de manière à ce que l'homme puisse aider la jeune femme à parvenir à l'orgasme.
- 11 - Chacun porte en soi un grand besoin d'aimer et d'être aimé. Pendant l'enfance, on se forge un schéma de femme ou d'homme imaginaire, rêvé... et le jour où on le rencontre, l'alchimie se produit, sans que l'on y prenne garde.
- 12 - Dans le domaine des sentiments humains, il n'y a pas de normalité. Il peut arriver qu'un homme ou une femme qui vit en couple éprouve de l'attraction pour quelqu'un d'autre. L'important, c'est de réfléchir à ce que l'on souhaite vivre et à la façon on va gérer ses choix. Alors qu'est-ce qu'aimer et s'engager avec quelqu'un ?
- 13 - Il est important de faire ce que l'on appelle quelques "concessions" pour que l'autre trouve sa place et puisse exister dans sa différence. L'amour de l'autre nous transforme, en principe "en mieux". Mais vouloir "modeler" l'autre pour l'adapter à nos propres désirs, à nos propres rêves... est tout à fait négatif et ne durera qu'un temps. Aimer, c'est grandir avec l'autre.
- 14 - En principe, les rapports sexuels épanouissants sont le résultat de deux désirs réciproques, mais on peut parfois accepter pour faire plaisir à l'autre.
- 15 - La fidélité est une question de confiance. Ce qui est important, c'est de parler. Parler avec l'autre de ses doutes, de ses difficultés, et aussi, de partager et de créer ensemble.
- 16 - La confiance se gagne chaque jour, non pas seulement par des paroles, mais également par des actes... La confiance se conjugue avec sincérité, loyauté, humilité. La confiance, c'est aussi : ne pas douter et laisser l'autre dans sa liberté.
- 17 - Certaines femmes le sont parce qu'elles ont eu des expériences douloureuses, parce qu'elles n'ont pas confiance en elles-mêmes, parce qu'elles subissent au lieu de participer, parce qu'elles ne savent pas exprimer à l'homme ce qui leur fait plaisir. La frigidité n'est pas une maladie, c'est un blocage dont il ne faut pas avoir peur de parler avec son compagnon ou avec un spécialiste.
- 18 - Oui, cela peut arriver, l'amour est différent de l'attraction physique et on peut être attiré par plusieurs personnes à la fois. Mais en ce qui concerne l'engagement profond, il est préférable (le plus confortable), d'avoir un seul amour à la fois.
- 19 - Oui, cet amour s'appelle "l'amour platonique". C'est une communication profonde... très proche de l'amitié. Mais pour un couple, l'amour physique est complémentaire.
- 20 - Chez les filles 17 ans. Chez les garçons 16 ans. La moitié des jeunes ont fait l'amour entre 15 et 18 ans. Attendre n'est pas un signe d'immaturité. On n'est jamais en retard pour le premier baiser ou la première relation sexuelle.
- 21 - L'intensité du plaisir peut être la même mais il y a des différences liées à l'identité sexuelle de chaque partenaire.
- 22 - Lorsque nos pensées se tournent toujours vers la même personne, quand on désire être avec elle, que l'on recherche avant tout son bonheur, et que... celle-ci nous rend heureux nous-même.
- 23 - Cela peut arriver... le plaisir est variable, et quelquefois il n'est pas au rendez-vous. Ce qui est important c'est qu'il soit présent, en général.
- 24 - Il n'y a pas d'obligation, chacun peut le dire ou pas en fonction de ce qu'il ressent.
- 25 - C'est une question tout à fait intime, il est avant tout essentiel d'en avoir envie soi-même.

Relations amoureuses et sexualité

26 - En la vivant soi-même sérieusement, en montrant que l'on tient à l'autre.

27 - C'est ne pas arriver à avoir une érection. C'est un trouble qu'il ne faut pas confondre avec des "pannes" occasionnelles (souvent provoquées par une trop grande émotion).

28 - C'est quand l'homme éjacule avant d'avoir pénétré sa partenaire ou au début de la pénétration, avant que les deux partenaires ne soient satisfaits. Cela arrive souvent lors des premières expériences sexuelles et s'arrange par la suite.

29 - Cela peut arriver, c'est pourquoi le partenaire doit être attentif et doux.

30 - C'est un problème psychologique le plus souvent, mais chez les adolescents cela peut être normal.

31 - Il n'y a pas d'âge, c'est une question de plaisir partagé et de confiance.

32 - g est l'initial de Graffenberg. Ce médecin pensait avoir décelé au niveau du vagin une zone particulièrement érogène et produisant l'orgasme. L'orgasme peut être provoqué par des caresses au niveau du clitoris. Les autres zones érogènes, dispersées sur tout le corps, ne sont pas les mêmes pour toutes les femmes. Quoiqu'il en soit, les partenaires peuvent apprendre dans leurs jeux amoureux, à découvrir et révéler ces zones.

33 - Seulement si on en a envie et si cela ne nuit pas au respect mutuel de chacun.

34 - C'est une rêverie propre à chacun. Les fantasmes sont naturels. Il ne faut pas se culpabiliser s'ils affleurent notre esprit. Cependant, ils ne sont pas toujours réalisables.

35 - Oui, mais ils ne sont pas toujours réalisables.

36 - Oui, cela fait partie de la découverte de son corps et du plaisir. C'est un acte naturel et intime.

37 - Quelqu'un ayant des rapports sexuels aussi bien hétérosexuels qu'homosexuel.

38 - Aphrodite.

39 - C'est un sentiment très fort que deux personnes ressentent l'une pour l'autre, mais qui ne s'exprime pas toujours et qui ne se traduit pas par relation sexuelle.

40 - C'est le point culminant du plaisir lors d'un rapport sexuel.

41 - Oui, c'est normal d'appréhender. Il est important d'en parler avec son(sa) partenaire. Le dialogue permet d'atténuer nos peurs.

42 - Non, les zones les plus sensibles chez la femme se trouvent en surface (clitoris) ou à 4 cm de l'entrée du vagin.

43 - Oui, c'est une agression sexuelle puisque la parole de l'autre est niée ou interprétée. Dans une relation, l'acceptation des deux personnes est essentielle.

44 - Se laisser aimer, c'est aimer déjà.

45 - Oui, le "coïtus interruptus" est risqué parce que des émissions de sperme peuvent se produire avant l'éjaculation, et aussi parce que l'homme peut ne pas se retirer assez vite. Et par ailleurs, le plaisir peut être plus difficile à atteindre. De plus, l'absence de préservatif entraîne un risque d'IST.

46 - La pédophilie, crime sexuel à l'encontre des enfants se retrouve dans toutes les formes de sexualité (hétérosexualité, homosexualité...). Les statistiques démontrent qu'il n'y a pas plus de pédophiles chez les homosexuels que chez les hétérosexuels. Le problème de la pédophilie se situe au niveau des personnes et non de leur orientation sexuelle.

47 - tous les êtres humains ont la même valeur, même si les cultures qui nous ont façonnés peuvent être différentes. Si vos parents voient que votre amour est fort et sincère et que vous êtes heureux, si votre ami(e) est respectueux, le temps et la patience pourront améliorer les choses.

48 - C'est une attitude de discrimination par rapport au sexe de l'autre. C'est un ensemble de comportement qui nient le droit à la liberté et à l'égalité de toute personne humaine. C'est tout ce qui méprise un sexe par rapport à l'autre. Exemple : refuser un emploi à cause du sexe est du sexisme.

49 - C'est l'attraction sexuelle entre personne de sexe opposé. Les couples hétérosexuels sont majoritaires.

50 - Auparavant, le jugement sur l'homosexualité était très péjoratif. Mais pourquoi l'orientation sexuelle du plus grand nombre devrait-elle être imposée à tous ? L'homosexualité existe dans tout les milieux et tous types de familles. Toutefois les homosexuels n'ont pas une vie facile. Pourquoi ne pas faire preuve de respect ? Si on vous fait l'amitié de vous mettre dans la confiance, le mieux n'est-il pas d'accepter l'autre tel qu'il est ? Mais il est possible de dire "je l'apprécie comme tu es".

51 - Non, dans l'état actuel de nos connaissances, mais ce n'est pas exclu (recherche en cours). L'homosexualité s'impose aux personnes. Si elle est assumée, elle peut devenir un vrai choix affectif. Elle est difficile à assumer à cause de la norme sociale. Ce n'est pas toujours facile à dire, à vivre de crainte d'être rejeté. Faire admettre aujourd'hui que l'homosexualité n'est pas anormale reste encore une étape difficile. Mais il est possible d'être heureux et épanoui en étant homosexuel.

52 - Elle peut s'adresser à un adulte proche et ouvert, à un médecin ou pourquoi pas à un psychologue. Il y a aussi le Point Accueil Ado.

53 - Par le sang (plaie ou règles), par les sécrétions vaginales.

54 - C'est le rejet de l'homosexualité et des personnes homosexuelles, se manifestant par la discrimination, l'exclusion ou la violence à l'encontre d'individus, de groupes ou de pratiques homosexuels. L'homophobie est une forme particulière de sexisme.

55 - Chez la jeune fille lors d'une excitation sexuelle, la vulve se modifie et s'humidifie. Ce liquide permet de mieux faire glisser le pénis dans le vagin lors de la pénétration : ce sont des sécrétions vaginales.